


## Intervención relativa al dolor en cuadrantes (desde 2003 hasta 2005)


Desde septiembre de 2003 se ha realizado un seguimiento sistemático a 677 pacientes a los que se había sometido a una intervención relativa al dolor en cuadrantes. Mediante un cuestionario se solicitaron datos básicos (edad, sexo, lateralidad manual), datos sobre el historial del paciente (años / meses preoperatorio, otros diagnósticos de fibromialgia, diagnóstico del acupuntor, tratamientos previos) e información sobre los síntomas (dolores, molestias) en los cuadrantes superiores o inferiores. Esto permitió un control de los resultados de las operaciones tras 3, 6 y 12 meses, así como tras 3 años. Además, el resultado operatorio puede valorarse también en relación con subgrupos, como por ejemplo dolores y síndrome de colon irritable. Presentamos a continuación un análisis de los datos.



### Observación postoperatoria a los 6 meses

De 634\* pacientes valorados, en el caso de 180 pacientes (un 28,39%) se logró eliminar por completo las molestias seis meses después de la intervención quirúrgica para paliar el dolor en los cuadrantes; 300 pacientes (un 47,32%) vieron cómo mejoraba su estado y en 154 pacientes (un 24,29%) no se modificaron los síntomas.


\* 43 sin localizar, por lo que no se tienen datos de los mismos



### Observación postoperatoria a los 12 meses

De 563\* pacientes valorados, en el caso de 285 pacientes (un 50,62%) se logró eliminar por completo las molestias un año después de la intervención quirúrgica para paliar el dolor en los cuadrantes; 231 pacientes (un 41,03%) vieron cómo mejoraba su estado y en 47 pacientes (un 8,35%) no se modificaron los síntomas.


\* 114 sin localizar, por lo que no se tienen datos de los mismos



### Observación postoperatoria a los 3 años

De 478\* pacientes valorados, en el caso de 294 pacientes (un 61,51%) se logró eliminar por completo las molestias tres años después de la intervención quirúrgica para paliar el dolor en los cuadrantes; 180 pacientes (un 37,66%) vieron cómo mejoraba su estado y en 4 pacientes (un 0,84%) no se modificaron los síntomas.

\* 199 sin localizar, por lo que no se tienen datos de los mismos



### Literature: Bauer J.A. Fibromialgia - la curación es posible

Autor: Johann Bauer  
 EDICIONES ROBIN BOOK  
 Páginas: 254, tapa blanda  
 Año Edición: 2008  
**ISBN-13: 9788479279608**  
**ISBN-10: 8479279605**

